



## مدينة الملك سعود الطبية KING SAUD MEDICAL CITY

### العلاج الهرموني

**قوزرلين** : يساعد في تثبيط الهرمونات الجنسية، ويساعد في إيقاف إنتاجها من المبايض لدى النساء أو الخصيتين لدى الرجال.

**متى يعطى القوزرلين** : الغوسيريلين يعطى للنساء اللاتي لديهن سرطان الثدي واللاقي لم ينقطع الطمث منهم. يعطى الغوسيريلين عادة مع الأدوية الهرمونية الأخرى ( مثل تاموكسفين او مثبطات انزيم الاروماسز) للمساعدة على تقليل فرص رجوع المرض بعد العملية الجراحية او للتحكم فيه في حال كان المرض منتشرًا. ويعطى أيضاً للرجال في حال سرطان البروستات للتقليل من مستوى هرمون التسترون المحفز لخلايا البروستات السرطانية.

**متى يستخدم القوزرلين**: الغوسيريلين يستخدم عن طريق الإبر الجلد وغالباً تأخذ جرعة واحدة 3ن6 ملجم كل أربع أسابيع. تستطيع الممرضة إعطاءك إياها في بعض المستشفيات. قد يجد بعض المرضى الحقن غير مريحة قليلاً مع وجود بعض الإحمرار أو تغير لون بشره للأغمق في جميع أنحاء المنطقة. تستطيع استخدام مخدر موضعي للتخفيف من الألم.

### بعض الآثار الجانبية المحتملة بعد استخدام القوزرلين:

- عدم انتظام الدورة الشهرية.
- التهبات الحارة. -
- الآم غير محددة في الثدي.
- التثدي لدى الرجال.
- ضعف في الرغبة الجنسية.
- تهيج مهبلي.
- طفح جلدي في موضع الحقن .
- ضعف الشعر.
- تغيرات في السلوك والمزاج.
- صداع.-
- إلتهاب المفاصل.
- التنمل في أصابع اليدين والرجلين.
- هشاشة العظام.

**أعداد:** أخصائية التنقيف الصحي فاطمة الفرج

**مراجعته وتدقيق:** أستاذي الأورام د. هاشم ياسين الهاشم

**المصدر:** <https://www.macmillan.org.uk>